

西尼羅河病毒之重要資訊須知

西尼羅河病毒 (WNV) 源於鳥類，並通過蚊子傳播。大多數被感染該病毒的蚊子叮咬過的人不顯示症狀或僅有輕微症狀。當 WNV 病毒引發疾病時，通常在 2 至 15 天內出現病症。在輕微病例中，常見的症狀包括發熱、頭痛和身體疼痛，有時有輕微的皮疹。

少數 (少於 1%) WNV 病毒感染者會發展呈現其他一些嚴重的疾病，例如腦膜炎和腦炎。腦膜炎為腦膜或脊髓出現炎症，而腦炎則為腦部本身發生炎症。這些炎症可能導致長期不愈的疾病甚至死亡。可能出現的症狀包括嚴重的頭痛、高熱、頸部僵硬、噁心、吞咽困難、嘔吐、嗜睡、神志不清、喪失知覺、缺乏協調性、肌肉乏力及癱瘓等。任何人一旦突然出現上述症狀，應立即尋求醫生的幫助。通過驗血確診是否感染 WNV 病毒，需要 1 至 2 周時間獲知結果。

哈密爾頓 (威美頓) 市採取如下措施降低感染 WNV 病毒的危險：

- 鼓勵公眾採取個人防護措施，例如：確保門窗設有維護良好、大小合適的紗窗；在外出時，穿著淺色的長衣長褲和襪子；在裸露的皮膚上塗抹含避蚊胺 (DEET) 成分的驅蚊劑 (請依照說明謹慎使用，如有必要，可請人翻譯。6 個月以下的嬰兒應避免使用)。
- 要求公眾清除花盆、輪胎、房頂溝槽、戲水池等處的積水，並請您的鄰居清除其住房周圍的積水。本市已責成市建築和執照管理處 (Building and Licensing Division) 處理有關積水的投訴，聯繫電話為：905-546-2782。
- 追蹤所有死鳥，查清 WNV 病毒是否流傳到某一地區並對人體健康構成威脅。如果您發現有死鳥，請通過本市網站的 WNV 專址 (www.hamilton.ca/westnile) 或致電 905-546-3575 向有關部門報告。
- 捕捉蚊子，並檢測其是否攜帶 WNV 病毒。
- 用經批准的化學藥球或顆粒殺滅城市路旁排水池中及積水處的蚊子幼蟲。

如有必要，本市將採取附加預防措施

如果感染 WNV 病毒的危險很大，且所有其他的控制措施 (如以上所述) 均不見效，本市將可能在一些居住區噴灑超低劑量的馬拉硫磷殺蟲劑。

加拿大衛生部害蟲防治管理局已確定：噴灑馬拉硫磷殺蟲劑滅殺蚊子不會危及人體健康。在加拿大，馬拉硫磷殺蟲劑自 1953 年起作為農用化學品用於抑制昆蟲。在溫尼伯市，用馬拉硫磷殺蟲劑滅殺蚊子成蟲已達數十年之久。

即使在較低濃度下，馬拉硫磷殺蟲劑也有明顯的異味。

如果在您的居住區有必要噴灑馬拉硫磷殺蟲劑，而您又希望減少與殺蟲劑的接觸，請採取以下措施：

- 在噴灑前，您可將晾曬的衣物、玩具和寵物帶回室內，遮蓋池塘，翻轉兒童戲水池，並關閉電扇和空調的外部通風口。
- 在噴灑時，您可留在室內，並關閉窗戶以防止異味進入室內。
- 在噴灑後，您可沖洗室外家具和遊戲設施。在食用前，應洗淨從菜園採摘的果蔬。

如何得知您所居住之地區是否會噴灑馬拉硫磷殺蟲劑？

在噴灑開始至少 48 小時之前，我們將通過本地新聞媒體發佈通知。此外，我們還將要求哈密爾頓的社區組織張貼佈告，並協助與公眾取得聯繫。

欲瞭解有關 WNV 病毒的更多資訊，請致電 905-546-2489 與哈密爾頓市政府聯繫，將有翻譯為您提供幫助。本市英文網站為您提供關於保護您與家人免受 WNV 病毒之害的詳盡資訊，網址是：www.hamilton.ca/westnile

