

CE À QUOI S'ATTENDRE après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19

IMMÉDIATEMENT APRÈS LA VACCINATION

Restez à la
clinique pendant
au moins
15 minutes.



À signaler au personnel de la clinique :

- Difficulté à respirer
- Enflure du visage, de la gorge ou de la langue
- Urticaire (bosses sur la peau qui causent des démangeaisons)

Vous pourriez éprouver des effets secondaires après votre départ de la clinique.

Effets secondaires fréquents et attendus

Certains effets secondaires sont normaux et attendus.

Effets secondaires possibles :

- Rougeur et enflure au point d'injection
- Fatigue
- Mal de tête
- Douleurs musculaires
- Douleurs articulaires
- Frissons
- Fièvre légère
- Enflure des ganglions lymphatiques (moins fréquent)

Ce que vous pouvez faire :

- Appliquer une compresse froide sur le point d'injection
- Prendre de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène
- Boire beaucoup de liquides



Si vous avez des inquiétudes concernant certains des effets secondaires fréquents, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.

Les réactions indésirables et ce qu'il faut faire

Les réactions graves sont très rares.

Signes possibles d'une réaction allergique grave :

- Difficulté à respirer
- Enflure du visage, de la gorge ou de la langue
- Urticaire (bosses sur la peau qui causent des démangeaisons)

Ce qu'il faut faire?

Composer le 9-1-1



hamilton.ca/COVIDvaccines